




โรคไขหวัดนก

นิยามโรคไขหวัดนกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563



นิยามโรคไขหวัดนก กรณีสงสัยว่าป่วย
มีการตายโดยไม่ทราบสาเหตุ



สัตว์ปีกที่เลี้ยง
ในระบบฟาร์ม

- อัตราการตายอย่างน้อยร้อยละ 1 ภายใน 2 วัน
- กินอาหารและน้ำลดลงร้อยละ 5 ภายใน 1 วัน
- ไข่ลดลงร้อยละ 5 ใน 1 วัน



สัตว์ปีกที่เลี้ยง
แบบหลังบ้าน

- มีการตายโดยไม่ทราบสาเหตุใน
หมู่บ้านเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียง
- ระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 7 วัน

และแสดงอาการอื่นร่วมด้วย ดังนี้

หายใจลำบาก หน้าบวม



ไข่ลด ไข่รูปร่างผิดปกติ



หงอย ซึม



หงอนและเหนียงมีสีคล้ำ



ขี้ก คอบิด



หน้าแข้งมีจุดเลือดออก



หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ ให้แจ้งอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนทันที

หรือแจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย

และวานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม



081-7278827,

094-7131444,

053-768461 ต่อ 11

